

Covid- 19: Campanha de vacinação tem alteração em horário

A partir desta quarta-feira, 17, a campanha de vacinação covid 19 continuará no CEP/UME, com alteração no horário, sendo das 8h às 13h

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde de Dracena informa que a partir desta quarta-feira, 17, a campanha de vacinação covid 19 continuará no CEP/UME, com alteração no horário, sendo das 8h às 13h, para atendimento de segunda e terceira doses. Confira o cronograma:

SEGUNDA DOSE AGENDADA

Vacinas Coronavac e Astrazeneca *(ver cartão de vacina)*

PARA MAIORES DE 18 ANOS

O Intervalo da PFIZER entre a 1ª e a 2ª dose são de 21 dias. levar o cartão da primeira dose, RG, CPF e comprovante de endereço.

INTERVALO DA VACINA PFIZER PARA

- **Pessoas com alto grau de imunossupressão:** pelo menos 28 dias após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independentemente do imunizante aplicado, considerando o calendário proposto para vacinação (ver item 3. População-alvo). Considera-se pessoas com alto grau de imunossupressão indivíduos que possuam:

I - Imunodeficiência primária grave

II - Quimioterapia para câncer

III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras

IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 < 200 cel/mm³

V - Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.

VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune *.

VII - Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise)

VIII - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

* Drogas modificadores de resposta imune consideradas para fim de elegibilidade a dose adicional da vacina para pessoas imunossuprimidas: Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatioprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (infiximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS*

Quem recebeu a primeira dose fique atento a segunda dose porque o intervalo entre uma e outra foi antecipado. Se você tomou a primeira dose há 8 semanas, está na hora de receber a segunda dose, vá até o posto de vacinação com o *cartão vacinal, RG, CPF, comprovante de endereço e o responsável legal.

3ª DOSES ou DOSE REFORÇO

Pessoas com 60 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose há mais de 6 meses.

IMUNOSSUPRIMIDOS:

ATENÇÃO: O intervalo entre a segunda e a terceira dose são de 28 dias.

REFORÇO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

O profissional precisa apresentar documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de endereço, holerite atual ou carteira profissional e que tenham tomado a segunda dose há mais de 6 meses.

Cedida Prefeitura