

Bebê de quatro meses morre engasgado em Lucélia

DA REDAÇÃO

No sábado, 6, por volta das 19h19, foi solicitado via Copom a presença da equipe da Polícia Militar pela Santa Casa de Lucélia tendo em vista a entrada de um bebê (sexo masculino) de quatro

meses em óbito.

No local houve a informação por um enfermeiro que por volta das 17h foi dada a entrada de um bebê pela Santa Casa já desfalecido devido engasgamento, disse ainda que a vítima sofria de refluxo e que

a genitora deixou o filho na cama dormindo, que em dado momento foi ao quarto e viu seu filho com sangue escorrendo pelo nariz e com secreções na boca, conduzindo-o imediatamente ao Pronto Socorro e que foi tentado reanimação

pela médica plantonista por aproximadamente uma hora sem êxito, vindo o bebê a entrar em óbito.

Foi elaborado BOPM e BOPC para apurações pertinentes ao caso.

Saiba o que fazer no caso de o bebê ficar engasgado

Veja as orientações do Corpo de Bombeiros de como proceder nessas situações

DICAS IMPORTANTES

- O engasgamento pode ocorrer no início da amamentação. **Após a amamentação**, tire a boca do bebê do peito, para que ele possa recuperar a respiração.
- Nunca** amamente a criança se estiver deitada. As chances tanto da mãe dormir, quanto do bebê sufocar são maiores.
- Mantenha o berço **sem tapetes, cobertores, bichos de pelúcia ou protetores de berço**, pois podem sufocá-lo.
- Quando terminar a amamentação, **aguarde 15 minutos** antes de deitar o bebê na cama ou no berço. Mesmo que ele já tenha arrotado.
- Na hora de dormir, **deite o bebê de costas**, com a cabeça voltada para o lado. **Não permita o uso** de vólvos, deixe o colchão levemente inclinado, para que a cabeça fique elevada.

CONTE COM A GENTE
BOMBEIROS
193
EMERGENCIA

EM CASO DE EMERGENCIA

- Mantenha a calma.
- Forneça ao atendente do Corpo de Bombeiros, o endereço da emergência com nome de cidade, rua, número e algum ponto de referência.
- Convide e responda a todas as perguntas.
- O serviço 193 destina-se a emergências. EVITE TROTOS.

CONHEÇA O CORPO DE BOMBEIROS

www.corpodebombeiros.sp.gov.br
@corpodebombeiros4spmesp
@corpodebombeiros4spmesp
@abombeiros4sp

ENGASGAMENTO DE BEBÊ

LETÍCIA PINHEIRO
DA REDAÇÃO

Após a triste notícia sobre o bebê de quatro meses que morreu por engasgamento em Lucélia, a reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Dracena para buscar informações sobre como se deve proceder em situações semelhantes. A equipe local disponibilizou material desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros do Estado com orientações a respeito, saiba mais sobre o assunto.

condições, o líquido deve sair pela boca e nariz e o choro é um bom sinal de recuperação.

Caso não haja reação, coloque o bebê em decúbito dorsal e realize cinco compressões no tórax, com os dedos. Se houver reação do bebê, coloque-o em posição confortável. É fundamental que a criança passe por uma avaliação médica.

De acordo com o material se não houver reação com as manobras efetuadas ou se o bebê perder a consciência, a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) deve ser iniciada.

SINAIS DE ENGASGAMENTO -

se o bebê não chora e não respira, sua pele pode ficar arroxeadada. Mantenha a calma e peça ajuda no telefone 193 ou 192.

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR EM BEBÊ

Coloque a criança deitada de costas em uma superfície rígida e plana, no centro do peito, na altura dos mamilos, usando os dedos médio e anelar, pressione o mais rápido e fundo possível o tórax do bebê.

A manobra deve ser efetuada com a frequência mínima de 100 compressões por minuto e não deve ser interrompida até a chegada do socorro.

SAIBA O QUE FAZER NO CASO DE O BEBÊ FICAR ENGASGADO

Em bebês menores de um ano, de acordo com especialistas, o mais comum é engasgar com líquidos, principalmente leite materno

SINAIS DE ENGASGAMENTO

- Se o bebê não chora e não respira, sua pele pode ficar arroxeadada. Mantenha a calma e peça ajuda no telefone 193 ou 192.
- Mantenha o bebê voltado para baixo, com a cabeça levemente mais baixa que o tórax, apoiado em seu antebraço. Sustente a cabeça e a mandíbula do bebê com a mão.



- Dê 5 (cinco) tapas no meio das costas do bebê, utilizando o calcanhar das mãos.



- Nessas condições o líquido deve sair pela boca e nariz. O choro é um bom sinal de recuperação.



- Caso não haja reação, coloque o bebê em decúbito dorsal e realize 5 (cinco) compressões no tórax, com os dedos.

- Se houver reação do bebê, coloque-o em posição confortável. É fundamental que a criança passe por uma avaliação médica.

ATENÇÃO! Se não houver reação com as manobras efetuadas ou se o bebê perder a consciência, inicie a ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

RCP EM BEBÊ

- Coloque a criança deitada de costas em uma superfície rígida e plana.
- No centro do peito, na altura dos mamilos, usando os dedos médio e anelar, pressione o mais rápido e fundo possível o tórax do bebê.
- A manobra deve ser efetuada com a frequência mínima de 100 compressões por minuto e não deve ser interrompida até a chegada do socorro.



O QUE FAZER

Mantenha o bebê voltado para baixo com a cabeça ligeiramente mais baixa que o tórax, apoiado em seu antebraço. Sustente a cabeça e a mandíbula do bebê com a mão.

Dê cinco tapas no meio das costas do bebê, utilizando o calcanhar das mãos, nessas