

ASTRAZENECA

DOSE	ORIENTAÇÃO
2ª Dose	<ul style="list-style-type: none">• Vacinas agendadas;• Pessoas com vacinas em atraso. <p>Observação:</p> <ol style="list-style-type: none">1. O intervalo entre a 1ª dose e a 2ª dose é de 08 semanas.

PFIZER

DOSE	ORIENTAÇÃO
2ª Dose	<ul style="list-style-type: none">• Vacinas agendadas;• Pessoas com vacinas em atraso. <p>Observação:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Para maiores de 18 anos o intervalo entre a 1ª dose e a 2ª dose é de 21 dias.1. Para os adolescentes de 12 anos a 17 anos o intervalo entre a 1ª dose e a 2ª dose é de 08 semanas.

CORONAVAC

DOSE	ORIENTAÇÃO
2ª Dose	<ul style="list-style-type: none">• Vacinas agendadas;• Pessoas com vacinas em atraso. <p>Observação:</p> <p>Verificar cartão de Vacinação</p>

3ª DOSE

- Profissionais da Saúde;
- Pessoas com 60 anos ou mais.
- Imunossuprimidos (veja imagem)

Observação:

1. *Profissionais da Saúde com 06 meses de intervalo entre a 2ª dose e a 3ª dose;*
1. *Pessoas com 60 anos ou mais com 06 meses de intervalo entre a 2ª dose e a 3ª dose;*
1. *Imunossuprimidos com 28 dias de intervalo entre a 2ª dose e a 3ª dose;*