

# Prematuridade foi comum na pandemia e acende alerta para risco maior de estrabismo

Reprodução Unsplash



Bebês nascidos antes do tempo têm maior risco de desenvolver problemas oculares

DA REDAÇÃO

A pandemia do novo coronavírus afetou a população mundial de várias formas. Infelizmente, a taxa de nascimento de bebês prematuros foi elevada em vista das complicações do covid-19 nas mães. A prematuridade é um fator de risco para diversas condições oculares, entre elas o estrabismo.

Segundo a oftalmopedia-

tra, Dra. Marcela Barreira, especialista em estrabismo, além dos efeitos clínicos do desalinhamento dos olhos, os bebês que desenvolvem a condição apresentam maior risco de redução da acuidade visual.

## EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Um estudo publicado no periódico BMC Ophthalmology apontou que a prematuridade e o baixo peso ao nascer são fatores de risco para o desenvolvimento do estrabismo. O estudo foi feito com um grupo de bebês nascidos a termo e um grupo de bebês prematuros com variadas idades gestacionais pré-termo.

No grupo dos bebês a termo, a prevalência do estrabismo foi de 2%, dentro dos dados existentes na literatura. Entre os prematuros de 29-32 semanas, a prevalência foi de 22%. Naqueles nascidos com menos de 28 semanas, foi de 26%.

## CONSULTA OFTALMOLÓGICA DEVE SER PRECOCE

“O mais importante é que os pais de bebês prematuros devem ser orientados a procurar alguns especialis-

tas, como um oftalmopediatra nos primeiros meses de vida. Há bebês que ainda na maternidade já são diagnosticados com algumas condições mais graves, como a retinopatia da prematuridade (ROP), catarata congênita etc.”, comenta Dra. Marcela.

“Entretanto, a consulta com um oftalmologista infantil é muito importante para detectar alterações visuais, em geral, que podem se desenvolver nos prematuros, como o estrabismo e erros refrativos”, reforça a médica.

## TRATAMENTO DO ESTRABISMO É CIRÚRGICO

O estrabismo é o desalinhamento do eixo visual que costuma se desenvolver na infância. As formas mais graves, inclusive, podem ser detectadas nos primeiros dias de vida. Quando não tratado, o estrabismo pode reduzir a visão da criança a medida em que o olho com o desvio não se desenvolve da mesma maneira.

Em outras palavras, a visão de um olho será melhor que a do outro, condição chamada de ambliopia. Além disso, a criança não irá desenvolver a visão binocular, essencial para enxergar em profundidade e em 3D.

“A cirurgia é o tratamento padrão para todos os tipos de estrabismo, com exceção do desvio causado pela hipermetropia, facilmente resolvido com o uso de óculos. Quanto mais cedo o procedimento for realizado, maior a chance promover um desenvolvimento visual saudável”, finaliza Dra. Marcela.

## Loterias



Acumulou - Concurso 2434

01 02 14 28 40 51



Acumulou - Concurso 5722

14 40 51 56 57



Acumulou - Concurso 2306

1ª SORTEIO  
11 12 25 45 46 50  
2ª SORTEIO  
08 11 12 21 31 41



Acumulou - Concurso 1721

15 25 30 33 39 57 74



Acumulou - Concurso 2244

03 10 14 18 19 26 29  
37 41 42 45 51 71 76  
77 80 90 92 97 98

**DATAS COMEMORATIVAS**

**DIA 07**

Dia Internacional da Aviação Civil  
Dia Nacional da Assistência Social  
Dia Nacional da Silvicultura

**FELIZ ANIVERSÁRIO**

**DIA 07**

AMANDA MENDONÇA SAMPAIO

KEITI SAKATE

NAIR GUTIERI ZANON