

Herpes simples pode afetar olhos e evoluir para lesões na córnea

Vírus pode ser transmitido pelo beijo, especialmente para recém-nascidos

DA REDAÇÃO

O herpes simples tipo 1 (HSV-1) é um vírus muito comum que infecta a maioria da população. A infecção se caracteriza pelo surgimento de bolhas doloridas que costumam se desenvolver nos lábios e na cavidade oral.

As lesões do herpes podem afetar outras áreas do rosto, como os olhos e pálpebras. Outra característica do herpes simples tipo 1 é que podem ocorrer vários episódios da infecção ao longo da vida.

De acordo com a oftal-



Reprodução Unsplash

Cerca de 60 a 80% da população em geral tem o vírus do herpes que fica latente no organismo

mologista Dra. Maria Beatriz Guerios, a infecção pelo herpes simples ocorre na infância. Porém, na maioria dos casos é uma infecção assintomática e autolimitada. O vírus se aloja nos gânglios sensoriais do nervo trigêmeo e fica latente. “A ativação do vírus é mediada por diversos fatores como estresse, baixa imunidade, exposição ao sol, traumas e quadros febris”.

Quando isso ocorre, o vírus migra por meio dos nervos até chegar nos tecidos. Embora o local mais afetado pela infecção seja a região dos lábios, a doença pode se espalhar e afetar as pálpebras e o globo ocular, sendo essa uma condição mais preocupante.

“Isso porque as lesões podem evoluir e invadir a córnea levando a um quadro de ceratite herpética. Trata-se de uma condição que exige tratamento para prevenir danos na visão”, ressalta a especialista.

Vale lembrar que há dois tipos de herpes simples: o HSV-1 e o HSV-2. O tipo 1 está ligado às lesões na região da face e o tipo 2 é uma variação relacionada à transmissão sexual cujas lesões se localizam nos órgãos genitais.

Além das bolhas doloridas

Quando o herpes simples afeta o globo ocular causa outros sinais e sintomas além das lesões características da infecção.

“As manifestações do herpes simples nos olhos lembram os da conjuntivite. Entretanto, na maioria dos casos apenas um dos olhos é afetado. Essa é uma característica essencial para diferenciar as duas doenças e tratar de forma adequada”, explica Dra. Maria Beatriz.

Entre as manifestações do herpes simples ocular estão:

- Sensação de corpo estranho, areia nos olhos
- Dor de cabeça
- Sensibilidade à luz
- Vermelhidão
- Lacrimejamento
- Coceira
- Irritação

Nas pálpebras, os sintomas são parecidos com aqueles que surgem quando a lesão eclode nos lábios. Geralmente a pessoa começa a sentir coceira que é seguida da eclosão de bolhas que se transformam em feridas.

A ceratite herpética é uma condição potencialmente grave para a visão. Por isso, na presença dos sintomas é preciso procurar um oftalmologista com urgência. Outro aspecto que chama a atenção no herpes ocular é sua taxa de recorrência que pode chegar a 50% em cinco anos. Herpes se transmite no beijo? Certamente você já leu notícias a respeito de recém-nascidos que contraíram o vírus do herpes depois de serem beijados ou manuseados nos primeiros dias de vida.

“O herpes simples é altamente contagioso, principalmente na fase em que as bolhas se rompem e soltam secreção. Portanto, o beijo ou o contato com um recém-nascido sem lavar as mãos é algo que não se deve fazer caso a pessoa esteja com a infecção em curso”, alerta Dra. Maria Beatriz.

O herpes neonatal é extremamente grave porque o recém-nascido não tem nenhuma defesa em seu sistema imunológico. As lesões podem causar diversos problemas graves e evoluir e levar o bebê a óbito.

Loterias

MEGA-SENA
Acumulou - Concurso 2513
05 15 24 34 45 52

QUINA
Acumulou - Concurso 5933
10 13 16 28 47

DUPLA SENA
Acumulou - Concurso 2409
1ª SORTEIO: 02 12 25 30 43 50
2ª SORTEIO: 01 18 38 40 49 50

TIMEMANIA
Acumulou - Concurso 1826
15 27 30 41 46 49 58

LOTOMANIA
Acumulou - Concurso 2356
01 11 12 14 15 38 45
56 59 60 61 66 71 74
75 76 80 81 82 89

DATAS COMEMORATIVAS

DIA 31

Dia da Nutricionista